

Každý škrečok vo vlastníctve alebo starostlivosti člena Slovenského klubu chovateľov škrečkov (ďalej len „člen“) má právo na vhodné životné podmienky a každý člen je povinný mu ich zabezpečiť.

Každý škrečok vlastnený alebo chovaný členom alebo v jeho starostlivosti má právo na:

- A) dôstojné zaobchádzanie, ochranu a pohodu,*
- B) vhodné chovné zariadenie a jeho vybavenie,*
- C) zabezpečenie hygieny,*
- D) ochranu pri preprave,*
- E) ochranu pri verejnom vystúpení,*
- F) vhodnú potravu a tekutiny,*
- G) ochranu pri rozmnožovaní,*
- H) starostlivosť o zdravie a jeho kontrolu.*

Za účelom plnenia bodov A) až H) vydáva Slovenský klub chovateľov škrečkov tieto

Pravidlá pre chov škrečkov.

Každý člen je povinný dodržiavať tieto pravidlá. Pri porušení alebo nedodržaní ustanovení týchto pravidiel môže byť člen sankcionovaný vylúčením z SKCHŠ. Člen je povinný dodržiavať aj všetky právne predpisy platné v Slovenskej republike, príp. v krajine pobytu, vzťahujúce sa na ochranu zvierat.

A) Dôstojné zaobchádzanie, ochrana a pohoda

1. Člen:

- je povinný pri akejkoľvek činnosti brať do úvahy potrebu ochrany škrečka pred smädom, hladom, podvýživou, nepohodlím, bolesťou, zraneniami, chorobami, strachom a úzkosťou a umožniť mu realizovať jeho prirodzené správanie v chovnom zariadení alebo mimo chovného zariadenia, najmä umožnením hrabania, ukryvania sa alebo stavania hniezda,
- je povinný umožniť škrečkovi rozvíjanie jeho daností vhodným rôznorodým vybavením chovného zariadenia,
- chová alebo stará sa len o toľko škrečkov, koľko mu umožňujú jeho osobné, materiálne alebo finančné možnosti,
- je povinný zabezpečiť rovnakú starostlivosť všetkým škrečkom v jeho vlastníctve alebo o ktoré sa stará, s výnimkou prípadov, ak škrečok zo zdravotných dôvodov vyžaduje osobitnú starostlivosť,
- nesmie škrečka nútiť na výkon, ktorý nezodpovedá jeho fyzickému stavu alebo biologickým schopnostiam,
- nesmie zaobchádzať so škrečkom tak, aby to viedlo k jeho fyzickému vyčerpaniu,
- nesmie škrečkovi spôsobovať bolesť, poranenie alebo utrpenie, uvádzať ho do stavu úzkosti alebo strachu,
- nesmie obmedzovať výživu škrečka z iných ako zdravotných dôvodov,
- nesmie podávať škrečkovi povzbudzujúce látky (doping) s cieľom meniť jeho výkon alebo vzhľad,
- nesmie chovať škrečky tak, aby si vzájomne spôsobovali utrpenie alebo poranenia,
- musí pri vytváraní chovných skupín alebo pri pridaní škrečka do existujúcej skupiny predchádzať problémom so sociálnym správaním, ku ktorým môže prichádzať v dôsledku zmeny sociálnej štruktúry skupiny. Škrečky chované v skupine musia mať možnosť schovať sa alebo ukryť sa pred ostatnými zvieratami v skupine. Škrečka, ktorý sa správa agresívne, je potrebné chovať oddelene od ostatných zvierat,
- je povinný vykonať opatrenia na zabránenie úteku škrečkov, ich neplánovaného alebo nežiaduceho rozmnožovania,
- nesmie opustiť škrečka s úmyslom ponechať ho bez adekvátnej starostlivosti inej osoby, ktorá je schopná sa o neho postarať; neprípustné je aj vypustenie škrečka do voľnej prírody,
- nesmie škrečka úmyselne zabiť; eutanáziu smie vykonať len veterinárny lekár.

B) Vhodné chovné zariadenie a jeho vybavenie

1. Chovné zariadenie a výbeh

Chovné zariadenie určené na chov škrečkov a výbeh musí byť konštruované tak, aby škrečok mal možnosť vidieť a počuť, čo sa deje v chovnom zariadení alebo vo výbehu a jeho okolitom prostredí a musí byť zabezpečené proti úteku. Minimálne prípustné rozmery chovného zariadenia určeného na chov škrečka sú 50 x 30 x 30 cm a na skupinový chov škrečkov Campbellových alebo Roborovského 60 x 30 x 30 cm. Podlaha chovného zariadenia musí byť vyrobená z pevného a pre škrečky neškodného materiálu bez otvorov umožňujúceho opretie každého prsta všetkých končatín. Ak sa v chovnom zariadení nachádzajú drôtené rošty ako poschodia, je nutné zakryť ich vhodným materiálom, napr. výkresom, kartónom, aby si škrečok nemohol poraniť končatiny, alebo aby mu končatina neuviazla v otvoroch. Pre chov škrečkov džungárskych, Campbellových, čínskych a Roborovského a pre chov samičky s mláďatami je vhodnejšie akvárium, terárium alebo box.

2. Umiestnenie chovného zariadenia

Škrečok ako zvierat aktívne najmä v noci musí mať počas dňa vytvorené podmienky na odpočinok a spánok bez rušenia.

Nesmie byť umiestnený v nepretržitej tme, ani v nepretržitom umelom osvetlení. Rovnako nepripustné je jeho umiestnenie v miestnosti s teplotou dlhodobo nižšou ako 18 °C alebo vyššou ako 25 °C, v prievane, na priamom slnku, v prašnom prostredí, tam, kde sa fajčí alebo hrozí únik nebezpečných látok. Počas horúcich dní je nutné zabezpečiť ochladzovanie chovného zariadenia.

3. Podstielka

Podlaha chovného zariadenia musí byť pokrytá vhodnou bezprašnou podstielkou vyrobenou z prírodných materiálov. Vhodné sú napr. bezprašné hobliny, bukové štiepky (napr. zn. Chipsi Extra), kukuričná drvina, drevené pelety, ľanová podstielka, Asan (určený pre hlodavce) a pod. Je nepripustné chovať škrečka bez podstielky, na novinovom, časopisovom alebo kancelárskom papieri, na prašnej alebo parfumovanej podstielke.

4. Materiál na stavbu hniezda

Vhodné sú nebielené, neparfumované, nevlhčené, nepotlačené servítky, kuchynské utierky alebo toaletný papier, kapok, ľanová podložka. Úplne nevhodné sú textilie, drevená vlna alebo iný vláknitý materiál či v obchodoch ponúkaná špeciálna vata pre škrečky - sú známe prípady, kedy sa škrečkom do vlákien zamotali končatiny tak, že sa prestali prekrvovať a museli byť amputované. Tiež sú známe prípady udusenia mláďat v týchto materiáloch.

5. Domček alebo iný úkryt

V chovnom zariadení musí byť domček alebo iný úkryt umožňujúci škrečkovi ukryť sa.

Prí domčekoch alebo úkrytoch je nutné:

- odstrániť zvyšky lepidla, lepiacej pásky alebo etikety s informáciami o výrobku alebo cene,
- ak sú spájané klinecami alebo iným kovovým spojovacím materiálom a tento materiál vytráča nad úroveň stien domčeka, je nutné ich buď odstrániť, alebo zatlať hlbšie do dreva, aby sa škrečok nemohol zraniť,
- ak sú na nich ostré hrany alebo trčiace triesky, je nutné zabrúsiť ich tak, aby sa škrečok nemohol zraniť.

Domček musí mať dostatočne veľký vstupný otvor umožňujúci bezpečný vstup aj škrečkovi s plnými lícnymi torbami bez rizika zranenia. Pre škrečky sýrske by mal mať veľkosť najmenej 7 x 7 cm a pre trpasličie škrečky 5 x 5 cm.

6. Koliesko na behanie

Koliesko (kolotoč) je nevyhnutným vybavením, ak nie je možnosť škrečkovi zabezpečiť dostatočne dlhý pobyt v priestoroch mimo chovného zariadenia (vo výbehu). Pre škrečka sýrskeho musí mať priemer min. 20 cm (ideálne 25 cm a viac) a pre ostatné druhy min. 15 cm (ideálne 20 cm a viac). Koliesko musí mať plnú a pevnú nášľapnú plochu, preto je nutné mriežkované kolieska prepliesť napr. výkresom, kartónom, priesvitnou fóliou a pod.

7. Iné vybavenie

Chovné zariadenie je vhodné vybaviť čo najrozmanitejšie, napr. rôznymi ohybnými mostíkmi, preliezačkami, kameňmi, tunelmi, konármi z vhodných stromov, nádobou s nie príliš jemným pieskom pre činčily (v ňom si škrečok môže čistiť srst' od mastnoty a realizovať prirodzenú potrebu hrabať; piesok pre vtáky nie je na tento účel vhodný), nádobu slúžiacu ako WC a pod.

8. Výbeh

Škrečkovi musí byť poskytnutá voľnosť pohybu, pričom musí mať možnosť stáť a ležať v prirodzenej polohe a bez ťažkosti sa otáčať. Toto sa dá zabezpečiť pomocou výbehu, ktorý musí byť dostatočne vysoký a pevný, aby ho škrečok nemohol preliezť, rozpojiť alebo prevrhnúť. Pri pobyte škrečka vo výbehu je člen povinný urobiť také opatrenia, aby si škrečok nemohol spôsobiť ujmu na zdraví alebo živote, napr. elektrickým prúdom pri hryzení káblov, pádom z vysokých predmetov, skonzumovaním jedovatej izbovej rastliny a pod.

9. Transportný box (ďalej len „prepravka“)

Prepravka musí mať dostatočný počet vetracích otvorov vo veku alebo v hornej časti, inak je riziko, že v nej bude zle cirkulovať vzduch a bude sa v nej zrážať vlhkosť. V prepravke musí byť dostatočne vysoká vrstva podstielky, najlepšie zo škrečkovej ubikácie, aby jeho stres z nového prostredia bol menší. V zime je nutné prepravku chrániť pred chladom, napr. jej umiestnením do tašky a obložením uterákmi, oblečením a pod. Počas horúcich dní je nutné zabezpečiť jej ochladzovanie.

10. Nevhodné vybavenie

Plastové predmety môže škrečok hryzť, kúsky plastov zjesť a tým si spôsobiť vážne zdravotné problémy, preto nie je vhodné používať plastové vybavenie. Je nevhodné používať tzv. gule alebo autá na behanie (škrečok do nich močí, má stres napr. z toho, že sa nemôže orientovať podľa hmatových fúzikov), uzatvorené kolieska, z ktorých škrečok nemôže odísť, kedy sám chce, špirálové tunely, poschodia a kolotoče bez plnej nášľapnej plochy – výnimkou je, ak sa nášľapná plocha zakryje vhodným materiálom.

11. Materiály

Materiály používané na výrobu chovného zariadenia, na stavbu domčekov alebo úkrytov, hniezd, ohrád a iného príslušenstva, s ktorými môže prísť škrečok do styku, sa konštruujú a udržiavajú tak, aby na nich neboli ostré hrany alebo výčnelky, na ktorých by sa škrečok mohol poraniť. Použité materiály nesmú byť pre neho škodlivé a musia predchádzať zraneniam napr. pádom v dôsledku pokĺznutia. Dvere, priechody, prielezy a tunely musia byť dostatočne široké a vysoké tak, aby prechádzanie nimi nespôsobovalo poranenie, napr. krmivom v lícných torbách. Pletivo alebo mreže v chovnom zariadení môžu mať otvory takej veľkosti, aby škrečok nemohol cez ne prestrčiť časť svojho tela a zachytiť sa v nich. Všetky zariadenia a materiály, s ktorými prichádza škrečok do styku, musia byť čistiteľné, dezinfikovateľné a udržiavané v čistom stave.

C) Zabezpečenie hygieny

1. Miesta znečistené močom je nutné čistiť minimálne dvakrát do týždňa, t.j. odstrániť znečistenú podstielku alebo znečistený materiál na stavbu hniezda, vymeniť náplň v toalete a umyť ju, umyť vybavenie znečistené výkalmi.
2. Výmena podstielky v celej ubikácii a umytie vybavenia sa robí podľa potreby, najmenej však raz za dva týždne. Časté vymieňanie podstielky, ak to nie je nutné, spôsobuje škrečkovi stres.
3. Pri čistení sa používajú prostriedky určené na čistenie vybavenia pre zvieratá, napr. Savo Prim (na báze chlóru), vhodný je taktiež ocot (na odstránenie močového kameňa), Virkon (účinkuje proti vírusom).
4. Po použití čistiacich prostriedkov je nutné predmety dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou.

D) Ochrana pri preprave

1. Každý člen je povinný pred prepravou skontrolovať, či je škrečok tejto prepravy schopný. Je zakázané prepravovať:
 - škrečka, ak by pri preprave došlo k zhoršeniu jeho zdravotného stavu,
 - tehotnú samičku alebo samičku do doby 4 týždňov po pôrode; výnimkou je len preprava na veterinárne vyšetrenie alebo ošetrenie,
 - mláďatá mladšie ako 4 týždne.
2. Pri preprave musí byť škrečok v prepravke, pričom:
 - prepravka musí byť zabezpečená tak, aby škrečok nemohol utiecť,
 - v jednej prepravke sa nesmie prepravovať neprimeraný počet škrečkov vzhľadom na jej rozmery,
 - prepravka musí byť umiestnená tak, aby nedochádzalo k jej pohybu (posúvaniu), strkaniu, hádzaniu, zvrhávaniu, nárazom, prevracaniu, zhadzovaniu alebo pádom,
 - s prepravovanými škrečkami nesmie byť manipulované dolu hlavou,
 - preprava musí prebiehať vo vodorovnej polohe,
 - musí byť neustále zabezpečené vetranie prepravky,
 - prepravka nesmie byť vystavená vysokým alebo nízkym teplotám alebo prudkým zmenám teploty, priamemu slnku alebo prievanu,
 - prepravovaný škrečok musí mať zabezpečené dostatočné množstvo vhodnej potravy a tekutiny, pričom tekutiny sa dodávajú prostredníctvom čerstvého ovocia, zeleniny alebo čerstvých rastlín. Nie je vhodné dávať do prepravky nádobu s vodou, pretože voda sa z misky ľahko vyleje a z napájačky môže kvapkať do podstielky. Vodu podávame vtedy, keď sa dopravný prostriedok nepohybuje,
 - iné súčasne prepravované predmety musia byť umiestnené tak, aby škrečkovi nespôsobili zranenie, utrpenie alebo stres.

E) Ochrana pri verejnom vystúpení

1. Verejným vystúpením sa rozumie najmä výstavy, prehliadky, exhibície, burzy a trhy zvierat. Kvôli zníženiu riziku nakazenia škrečka chorobou alebo parazitmi sa odporúča mať škrečka počas verejného vystúpenia v uzatvorenej prepravke podľa písm. B) bod 9, vyberať ho z nej čo najmenej a nedovoľiť iným účastníkom dotýkať sa ho.
2. Z dôvodu zabránenia prenosu infekčných chorôb alebo parazitov je nutné po manipulácii holou rukou s cudzími škrečkami umyť si ruky dezinfekčným prostriedkom.
3. Je zakázané zúčastniť sa verejného vystúpenia so škrečkom v prípade, ak:
 - má zhoršený zdravotný stav,
 - trpí na prenosné ochorenie,
 - má parazity,
 - ide o tehotnú samičku alebo samičku do 4 týždňov po pôrode,
 - ide o mláďatá mladšie ako 4 týždne,
 - pri verejnom vystúpení pociťuje utrpenie alebo úzkosť,
 - ak priestory, v ktorých sa verejné vystúpenie koná, nie sú vhodné k zachovaniu zdravia a pohody zvieratá, napr. ak je príliš hlučné, prašné, teplota vzduchu je príliš vysoká alebo príliš nízka, hrozí riziko nakazenia škrečka prenosným ochorením alebo parazitmi od iných zvierat zúčastňujúcich sa verejného vystúpenia,
 - nie je zabezpečená bezodkladná veterinárna pomoc v prípade zranenia alebo akéhokoľvek náhleho zhoršenia sa zdravotného stavu škrečka počas verejného vystúpenia.

F) Vhodná potrava a tekutiny

1. Škrečok musí mať neustále k dispozícii vhodné krmivo a čistú vodu.
2. Krmivo musí byť podávané v množstve potrebnom na zabezpečenie škrečkovho dobrého zdravotného stavu a jeho nutričných potrieb a musí ho byť dost' na to, aby si časť z neho mohol inštinktívne uložiť ako zásobu.
3. Pri skupinovom chove škrečkov musí mať každý jedinec v skupine zabezpečený prístup k potrave a vode.
4. Keďže škrečok nie je čistý bylinožravec, je nutné dávať mu minimálne 2 – 3-krát do týždňa potravu bohatú na bielkoviny - prednostne živočíšneho pôvodu.
5. Vhodné čerstvé ovocie, zeleninu (zelenina by mala byť podávaná častejšie ako ovocie) alebo rastliny je nutné podávať aspoň 4-krát do týždňa, optimálne každý deň, nie však v dňoch, keď škrečok dostane mliečne výrobky,

aby sa predišlo hnačke. Čerstvá potrava sa nezbera na miestach, kde môže byť znečistená výkalmi zvierat (na takto znehodnotených rastlinách sa môžu nachádzať choroboplodné zárodky), alebo v blízkosti ciest. Čerstvé rastliny sa nesmú zberať do mikroténových vrecúšok, pretože by mohlo dôjsť k ich zapareniu, v dôsledku čoho by sa mohol škrečok zduť. Zduťie môže skončiť smrťou zvieratá. Čerstvú potravu je nutné pred podávaním dôkladne umyť a usušiť. Neskonsumované zvyšky je nutné najneskôr 24 hod. od podania odstrániť, aby sa predišlo ich hnitiu alebo plesniveniu; v horúcich letných dňoch by sa mali odstrániť ešte skôr. Ovocie sa nepodáva škrečkom s cukrovkou a ako prevencia pred jej vznikom by sa nemalo podávať ani zdravým škrečkom Campbellovým. Čerstvé ovocie sa nepodáva mláďatám do veku 3 týždňov, pretože by sa u nich mohol objaviť životu nebezpečný ascites – hromadenie tekutiny v dutine brušnej.

6. Je nepripustné podávať potravu nahnitú, plesnivú alebo inak znehodnotenú! Pri nahnitom alebo plesnivom ovoci alebo zelenine nepostačuje odstrániť len postihnutú časť, pretože škodlivé látky, ktoré vznikajú pri hnití alebo plesnivení, sú už rozšírené v celej potravine.
7. Škrečkovi celý život dorastajú hlodáky, preto musí mať zabezpečený trvalý prístup k tvrdému krmivu alebo k inému prírodnému materiálu vhodnému na hľadanie, napr. vetvičkám z vhodných stromov, sušeným bylinkám a pod. Pri nedostatočnom obrusovaní hlodákov môže dôjsť k ich prerasteniu, následne k zhoršenému alebo znemožnenému príjmu potravy, zhoršeniu zdravotného stavu, príp. aj úmrtiu.
8. Podávajú sa len tie druhy potravy, pri ktorých je isté, že nie sú pre škrečka nebezpečné.
9. Podávaná potrava musí mať izbovú teplotu.
10. Škrečok potrebuje nepretržitý prístup k čistej, čerstvej vode. Nevhodná na podávanie je voda sytená, minerálna alebo ochutená. Voda sa podáva v miske alebo napájačke a mení sa každý deň. Znečistená voda v miske sa vymieňa hneď. Vhodnejšie je používať napájačku, pretože sa do nej nedostanú nečistoty. Pod napájačku nie je vhodné umiestniť krmivo. Voda z napájačky nesmie kvapkať do podstielky.

G) Ochrana pri rozmnožovaní

1. Rozmnožovanie je zámerné alebo náhodné spárenie škrečkov smerujúce k narodeniu novej generácie zvierat. Odchov mláďat je nutné veľmi dobre zväziť, pretože škrečky zvyčajne majú veľký počet mláďat a pre všetky je potrebné nájsť vhodných majiteľov.
2. Člen je povinný zabezpečiť, aby nedochádzalo k náhodnému páreniu jeho škrečkov. Je nepripustné, aby sa člen SKCHŠ zbavoval vlastných škrečkov alebo mláďat ich odovzdaním, predaním alebo darovaním:
 - do obchodu so živými zvieratami (tzv. zverimex),
 - ako krmiva pre iné zvieratá,
 - osobe, ktorá ich bude predávať na kŕmne účely,
 - osobe mladšej ako 15 rokov bez súhlasu jej rodičov,
 - ako ceny do akejkoľvek súťaže alebo tomboly,
 - ich vypustením do voľnej prírody.
3. Škrečok sa môže použiť na rozmnožovanie až po dosiahnutí pohlavnej a telesnej dospelosti za predpokladu, že nemá vážnu poruchu, ktorá by mohla byť geneticky viazaná, neprejavuje znaky patologického správania sa, najmä agresivitu alebo bojzlosť, a plemenitba ani zvolené chovné postupy nespôsobujú utrpenie alebo poranenie hociktorého z dotknutých zvierat, nespôsobujú im trvalé následky a neočakáva sa nežiaduci genetický vplyv na potomstvo a ďalšie generácie.
4. Nepripustné je páriť:
 - a) dvoch jedincov s rovnakým letálnym génom, a to:
 - pri škrečkoch sýrskych s génom svetlo šedá (Lglg x Lglg): ¼ mláďat z tohto spojenia uhynie buď už v maternici, alebo krátko po narodení. Mláďatá uhynuté v maternici by mohli kalcifikovať a tak zbytočne zaťažovať organizmus samic,ky,
 - pri škrečkoch sýrskych s génom dominante bodkovaný (Dsds x Dsds): ¼ mláďat z tohto spojenia uhynie už v maternici, kde by mohli kalcifikovať a tak zbytočne zaťažovať organizmus samic,ky,
 - pri škrečkoch sýrskych s génom biele brucho/šiml (Whwh x Whwh): ¼ mláďat z tohto spojenia sa rodí bez očí alebo len so zvyškami očí, často bývajú aj hluché a zomierajú skôr ako mláďatá z iných spojení,
 - nevhodné je aj párenie dvoch škrečkov sýrskych s génom Sasa (saténová srst') (Sasa x Sasa): ¼ mláďat z takéhoto spojenia budú tzv. „dobule satení“, ktorí môžu vyzeráť ako vyplznutí, keďže ich srst' bude veľmi jemná (tenká),
 - riskantné je používať k chovu škrečka sýrskeho s génom c^dc^d (tmavouchý albin), pretože tento gén maskuje ostatné farby a vzory srsti, a teda môže zakrývať prítomnosť letálneho génu Whwh,
 - pri škrečkoch Campbellových s génom strakatý (Mimi x Mimi): ¼ mláďat z tohto spojenia sa narodí bez očí alebo so zvyškami očí a budú bezzubí, čo povedie k ich úmrtiu v rannom veku (krátko po prechode na pevnú stravu, ktorú nedokážu hrýzť),
 - pri škrečkoch džungárskych s génom perla (Pepe x Pepe): predpokladá sa, že ¼ mláďat z tohto spojenia uhynie už v maternici, kde by mohli kalcifikovať a tak zbytočne zaťažovať organizmus samic,ky,
 - pri škrečkoch čínskych s génom dominantne bodkovaný (Dsds x Dsds): ¼ mláďat z tohto spojenia uhynie už v maternici, kde by mohli kalcifikovať a tak zbytočne zaťažovať organizmus samic,ky.
 - b) akéhokoľvek samčeka s bezsrstou samic,kou: samic,ka nemá mlieko, mláďatá by po narodení uhynuli,

- c) škrečky, ktoré trpia na prenosné, alebo dedičné choroby (napr. cukrovku, rakovinu, epilepsiu, HaPV), alebo genetické chyby,
 - d) škrečky, ktoré sú agresívne,
 - e) škrečky džungárske so škrečkami Campbellovými,
 - f) škrečky džungárske alebo Campbellove, ktoré nemajú preukaz pôvodu, výpis predkov alebo iný dokument o pôvode preukazujúci, že nejde o škrečka hybridného pôvodu,
 - g) škrečky hybridného pôvodu,
 - h) neprípustná je aj príbuzenská plemenitba, teda párenie:
 - súrodencov,
 - rodiča s jeho priamym potomkom v prvom a druhom rade (t.j. otca s dcérou alebo vnučkou alebo matku so synom alebo vnukom).
- Výnimku z tohto pravidla schvaľuje Rada.
5. Pri krytí musí mať samicke vek najmenej 3,5 mesiaca (ideálne 4 mesiace,) keď je ukončený jej vývin, a najviac jeden rok. Samička škrečka sýrskeho nesmie mať pri krytí váhu menšiu ako 120 g (ideálna je najmenej 130 g), samicke džungárskeho alebo Campbellovho menšiu ako 45 g, samicke škrečka čínskeho menšiu ako 30 g a samicke škrečka Roborovského menšiu ako 26 g. Je vhodné, aby aj samček, ktorým sa kryje, mal minimálne rovnakú hmotnosť ako je určená pre samičky, aby sa predišlo rozmnožovaniu príliš malých škrečkov.
 6. Prvý vrh by mala mať samicke najneskôr vo veku 6 mesiacov. Prvý vrh vo vyššom veku ju môže ohroziť na zdraví a živote.
 7. Odstup medzi pôrodom a ďalším krytím musí byť najmenej 2 mesiace. Táto doba sa ráta odo dňa samičkinho pôrodu. Maximálny počet pôrodov jednej samičky za život sú 3. Výnimku z tohto pravidla schvaľuje Rada.
 8. Mláďatá musia zostať s matkou do veku najmenej 4 týždne, maximálne však do veku 5 týždňov, potom sa musia rozdeliť podľa pohlavia, aby sa predišlo nevhodnému a navyše príbuzenskému páreniu príliš mladých samičiek. Matka môže zostať so samičkami tak dlho, kým sa s nimi znesie.
 9. K novým majiteľom môžu ísť mláďatá najskôr vo veku 5 týždňov a s minimálnou hmotnosťou:
 - 50 g u škrečkov sýrskych,
 - 35 g u škrečkov džungárskych a Campbellových,
 - 25 g u škrečkov čínskych,
 - 20 g u škrečkov Roborovského.
 10. Každý člen je povinný spolu s mláďaťom odovzdať novému majiteľovi preukaz pôvodu, ktorý vystaví SKCHŠ, a základné informácie o chove (leták alebo príručku o chove vydané SKCHŠ).

H) Starostlivosť o zdravie a jeho kontrola

1. Každý člen SKCHŠ je povinný denne kontrolovať všetky škrečky, ktoré má vo vlastníctve alebo starostlivosti.
2. Pri kontrole je nutné zamerať sa najmä na:
 - správanie sa škrečka: zmena v správaní môže byť v dôsledku choroby alebo poranenia,
 - telesnú kondíciu a pohyb: zhoršená telesná kondícia alebo pohyblivosť môže byť zapríčinená chorobou alebo poranením,
 - výživový stav,
 - vzhľad:
 - a) srsti: je nutné všímať si najmä, či škrečok nemá parazity, či mu nevypadáva srst' (môže to byť v dôsledku napr. plesňového ochorenia alebo parazitov), aká je jej kvalita (zhoršená kvalita môže signalizovať napr. zlú výživu, nedostatok niektorých potrebných látok v potrave),
 - b) kože: je nutné všímať si, či škrečok nemá poranenia, vyrážky, výrastky, nádory, či nie je koža podráždená (môže to byť napr. v dôsledku alergie),
 - c) očí: je nutné všímať si, či nie sú zalepené, zahnisané, zapálené, či z nich netečie výtok,
 - d) uší,
 - e) okolia análneho otvoru: znečistené okolie môže byť v dôsledku hnačky, ktorá je pre škrečka životu nebezpečná,
 - f) končatín: je nutné všímať si, či škrečok nemá zlomeninu, ako na končatiny našľapuje,
 - g) pazúrov: ak si ich škrečok nedokáže obrúsiť sám, môžu mu prerastené pazúry spôsobovať problémy pri chôdzi, alebo zarásť až do živého tkaniva. Prerastené pazúry je nutné skrátiť (opatrne, aby sa predišlo úrazu, napr. odstrihnutiu prsta),
 - h) vzhľad výkalov: príliš riedky trus môže byť v dôsledku životu nebezpečnej hnačky, krvavý moč môže byť v dôsledku zápalu močových ciest, močových alebo obličkových kameňov, piesku alebo chorôb obličiek, nádorov.
3. Je zakázané podávať škrečkovi lieky, ak to neurčil veterinárny lekár. Výnimku tvoria len lieky, ktoré sú voľne v predaji, ale len tie, ktoré sa môžu podávať aj škrečkom. Lieky určené pre ľudí alebo pre iné zvieratá môžu škrečkovi spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť.
4. Škrečky Campbellove sú náchylné na vznik cukrovky, preto je nutné testovať ich na prítomnosť cukru v moči. Testy je nutné robiť opakovane.
5. Škrečky Campbellove je vhodné držať na diéte po celý ich život, aby sa predišlo rozvoju cukrovky. To znamená

vylúčiť zo stravy najmä všetky druhy ovocia, rôzne extrudáty, pečené maškrty a pelety (ako spojivo sa v nich používa med, melasa alebo škrob, ktoré majú vysoký obsah cukru).

6. Je úplne neprípustné používať v chove zvieratá, u ktorých bola zistená cukrovka, resp. prítomnosť cukru v moči. Pred krytím škrečkov Campbellových a čínskych je nutné urobiť im test na prítomnosť cukru v moči v dvoch rôznych dňoch čo najbližších k plánovanému dňu krytia, a to u samičky aj samčeka.
7. Každý člen, ktorý u jeho škrečkov vedených v registri škrečkov (ďalej len „register“) alebo u ich potomkov zistí chorobu, ktorá môže byť dedičná, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť do registra. Ak chorobu zistí u registrovaného škrečka alebo u jeho potomka iný člen, má tiež povinnosť nahlásiť to do registra. Člen je tiež povinný hlásiť do registra úmrtie škrečka a dôvod úmrtia, ak mu je známy. Choroby a dátumy úmrtia sa poznačia v registri. V prípade zistenia prenosného ochorenia alebo parazitov je člen povinný oznámiť to aj novým majiteľom jeho škrečkov, ktoré sa mohli v materskej CHS nakaziť.
8. Ak má člen podozrenie na prenosné ochorenie alebo parazity v jeho chove, alebo ak ho na to upozorní iná osoba, je povinný nechať chov vyšetriť u veterinára.
9. V prípade choroby alebo úrazu u škrečka je povinnosťou člena poskytnúť mu starostlivosť. Ak ju nedokáže poskytnúť sám, je povinný zabezpečiť veterinárnu starostlivosť. Ak je to potrebné, chorý alebo poranený škreček sa izoluje od ostatných škrečkov, pričom stále musia byť zabezpečené podmienky jeho chovu podľa tejto smernice.
10. V prípade závažného zdravotného stavu, keď nie je nádej na nápravu a škreček by sa len trápil, je člen povinný zabezpečiť škrečkovi eutanáziu u veterinára. V prípade náhlych, neočakávaných úmrtí je vhodné nechať na škrečkovi vykonať pitvu.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1.11.2012.

